

## Factores de Riesgo para Sordera

- Sospecha de los padres y/o familiares.
- Antecedente familiar de sordera infantil.
- Haber permanecido en Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales.
- Color amarillo de la piel en los primeros días de vida que requirió de transfusión sanguínea.
- Uso de medicamentos como amikacina y gentamicina.
- Infecciones durante el embarazo como citomegalovirus, rubéola, toxoplasmosis.
- Malformaciones de cráneo y/o cara.
- Meningitis.
- Traumatismo de cráneo que haya presentado fractura.



## El paquete de Tamizaje Auditivo Integral incluye:

1. Otoscopia (revisión de los oídos).
2. Emisiones Otoacústicas de Tamizaje.
3. Emisiones Otoacústicas de Diagnóstico.
4. Reporte impreso de los resultados.



● Dra. Lizette Jaqueline Sánchez Anaya  
Posgrado en Audiología Pediátrica

● Dr. Roberto Rodríguez Becerra  
Posgrado en Foniatria



## Detección Oportuna de la Sordera en Niños

Consultorio Médico  
Isla Cozumel #2864  
Col. Jardines de la Cruz  
Guadalajara, Jalisco

● Previa Cita  
Tels: 96-27-82-56, 16-76-44-22  
Cel: 044-33-11-59-58-06

Correo: [audicion.voz.mareo@hotmail.com](mailto:audicion.voz.mareo@hotmail.com)

Médicos Especialistas en  
Comunicación, Audiología y  
Foniatria

(Certificados por el Consejo  
Mexicano de Comunicación,  
Audiología y Foniatria)

# Sordera



En México alrededor de 10 millones de personas tienen algún grado de sordera.

3 de cada 1,000 recién nacidos puede presentarla, lo cual aumenta en bebés que tuvieron algún factor de riesgo al nacimiento.

Cuando un niño presenta pérdida auditiva en etapas tempranas de la vida no se llevan a cabo los procesos para la adquisición del lenguaje de forma adecuada.

La meta de la detección y manejo oportuno de la sordera es mejorar la adquisición del lenguaje y su desarrollo académico.

## Tamiz auditivo

Procedimiento sencillo y rápido que permite identificar a los bebés o niños pequeños susceptibles de presentar problemas auditivos.

Es el paso inicial en la detección oportuna de la sordera.

## Emisiones Otoacústicas

Estudio a través del cual se puede realizar el tamiz auditivo.

Para realizarlo el paciente tiene que estar tranquilo, de preferencia dormido.

La duración es de 10-15 minutos.

Se coloca una sonda en el oído del paciente, el equipo emite unos sonidos y mide la respuesta del oído interno.



## Lo ideal es:

- Que todos los niños tengan acceso al tamiz auditivo.
- A los que no pasen el estudio (ni el subsecuente) realizarle estudios confirmatorios antes de los 3 meses.
- En quienes se confirme algún grado de sordera, iniciar su manejo antes de los 6 meses.
- Los que pasen el estudio pero cuenten con factores de riesgo para sordera deben recibir monitoreo audiológico y del lenguaje.

